【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。

【 坐薬を併用するときの注意点 】

ダイアップ坐剤（熱性けいれん予防）と アンヒバ坐剤（熱冷まし）の場合

① まずダイアップ坐剤を先に使用して下さい。

② 30分以上時間をおいてから アンヒバ坐剤を使用して下さい。

※ ダイアップとアンヒバを同時に使うと、ダイアップ坐薬が
十分に吸収されない可能性があるためです。

※ 熱冷ましの飲み薬、吐き気止め坐薬（ナウゼリン）は問題ありません。