

【粉薬の飲ませ方】

【粉薬の飲ませ方】

● **ペースト状にして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、数滴の水を加えてペースト状に練ります。
- ② 手をきれいに洗って、練った薬を指先につけ、お子様の口の中（上あごや頬の内側）に塗りつけます。
- ③ 最後に水を含ませて、薬を飲み込ませてください。

● **ペースト状にして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、数滴の水を加えてペースト状に練ります。
- ② 手をきれいに洗って、練った薬を指先につけ、お子様の口の中（上あごや頬の内側）に塗りつけます。
- ③ 最後に水を含ませて、薬を飲み込ませてください。

● **水などに溶かして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、少量ずつ水を加えてシロップ状にします。
- ② 溶かした薬をスプーンやスポイドを使って飲ませてください。
- ③ 薬を飲んだ後、口の中に薬が残らないように水を飲ませてください。

● **水などに溶かして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、少量ずつ水を加えてシロップ状にします。
- ② 溶かした薬をスプーンやスポイドを使って飲ませてください。
- ③ 薬を飲んだ後、口の中に薬が残らないように水を飲ませてください。

● **食べ物に混ぜて飲ませる**

アイスクリーム（特にチョコレート）、ゼリー、プリンなど、子どもが好きな食べ物に混ぜたり、挟んだりして飲ませることができます。

● **食べ物に混ぜて飲ませる**

アイスクリーム（特にチョコレート）、ゼリー、プリンなど、子どもが好きな食べ物に混ぜたり、挟んだりして飲ませることができます。

★ 溶かしたり混ぜたりする場合、**飲みきれだけの量**にしましょう。（目安としては小さじ半分くらい、約2ml）。そして必ず**服用直前**にします。長時間そのままにしておくと苦味が強くなったり、薬の効果が弱くなってしまうこともあるので注意して下さい。

★ ミルクやご飯など**主食**に混ぜたり、哺乳瓶またはその乳首を使うと、薬嫌いから**ミルク・哺乳瓶嫌い**になることがあるのでなるべく**避けて**下さい。

★ **スポイト**を使う場合には、赤ちゃんの頭をしっかりと固定し、口の端から内側に沿わずようにして飲ませてあげて下さい。

★ **ハチミツはボツリヌス菌が含まれている場合があります、1歳未満の乳児には食べさせない**よう気をつけて下さい。

★ 溶かしたり混ぜたりする場合、**飲みきれだけの量**にしましょう。（目安としては小さじ半分くらい、約2ml）。そして必ず**服用直前**にします。長時間そのままにしておくと苦味が強くなったり、薬の効果が弱くなってしまうこともあるので注意して下さい。

★ ミルクやご飯など**主食**に混ぜたり、哺乳瓶またはその乳首を使うと、薬嫌いから**ミルク・哺乳瓶嫌い**になることがあるのでなるべく**避けて**下さい。

★ **スポイト**を使う場合には、赤ちゃんの頭をしっかりと固定し、口の端から内側に沿わずようにして飲ませてあげて下さい。

★ **ハチミツはボツリヌス菌が含まれている場合があります、1歳未満の乳児には食べさせない**よう気をつけて下さい。

【粉薬の飲ませ方】

【粉薬の飲ませ方】

● **ペースト状にして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、数滴の水を加えてペースト状に練ります。
- ② 手をきれいに洗って、練った薬を指先につけ、お子様の口の中（上あごや頬の内側）に塗りつけます。
- ③ 最後に水を含ませて、薬を飲み込ませてください。

● **ペースト状にして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、数滴の水を加えてペースト状に練ります。
- ② 手をきれいに洗って、練った薬を指先につけ、お子様の口の中（上あごや頬の内側）に塗りつけます。
- ③ 最後に水を含ませて、薬を飲み込ませてください。

● **水などに溶かして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、少量ずつ水を加えてシロップ状にします。
- ② 溶かした薬をスプーンやスポイドを使って飲ませてください。
- ③ 薬を飲んだ後、口の中に薬が残らないように水を飲ませてください。

● **水などに溶かして飲ませる**

- ① 小さな容器の中に粉薬を入れ、少量ずつ水を加えてシロップ状にします。
- ② 溶かした薬をスプーンやスポイドを使って飲ませてください。
- ③ 薬を飲んだ後、口の中に薬が残らないように水を飲ませてください。

● **食べ物に混ぜて飲ませる**

アイスクリーム（特にチョコレート）、ゼリー、プリンなど、子どもが好きな食べ物に混ぜたり、挟んだりして飲ませることができます。

● **食べ物に混ぜて飲ませる**

アイスクリーム（特にチョコレート）、ゼリー、プリンなど、子どもが好きな食べ物に混ぜたり、挟んだりして飲ませることができます。

★ 溶かしたり混ぜたりする場合、**飲みきれだけの量**にしましょう。（目安としては小さじ半分くらい、約2ml）。そして必ず**服用直前**にします。長時間そのままにしておくと苦味が強くなったり、薬の効果が弱くなってしまうこともあるので注意して下さい。

★ ミルクやご飯など**主食**に混ぜたり、哺乳瓶またはその乳首を使うと、薬嫌いから**ミルク・哺乳瓶嫌い**になることがあるのでなるべく**避けて**下さい。

★ **スポイト**を使う場合には、赤ちゃんの頭をしっかりと固定し、口の端から内側に沿わずようにして飲ませてあげて下さい。

★ **ハチミツはボツリヌス菌が含まれている場合があります、1歳未満の乳児には食べさせない**よう気をつけて下さい。

★ 溶かしたり混ぜたりする場合、**飲みきれだけの量**にしましょう。（目安としては小さじ半分くらい、約2ml）。そして必ず**服用直前**にします。長時間そのままにしておくと苦味が強くなったり、薬の効果が弱くなってしまうこともあるので注意して下さい。

★ ミルクやご飯など**主食**に混ぜたり、哺乳瓶またはその乳首を使うと、薬嫌いから**ミルク・哺乳瓶嫌い**になることがあるのでなるべく**避けて**下さい。

★ **スポイト**を使う場合には、赤ちゃんの頭をしっかりと固定し、口の端から内側に沿わずようにして飲ませてあげて下さい。

★ **ハチミツはボツリヌス菌が含まれている場合があります、1歳未満の乳児には食べさせない**よう気をつけて下さい。